

## Superior Mobile Insurance Solutions

可让投保人在自己家中或工作场所，或在签约的机构或诊所舒适方便地接受辅助医疗检查。检查将由一名医务人员或一名医生（限某些情况）进行，检查项目包括：

- 抽血
- 尿样
- 血压
- 心电图 (EKG)
- 健康史
- 身高体重
- 臀围和腰围
- 脉搏
- 体格检查
- GoParamed – 一种收集病史的电子方法

请携带这本小册子，以便您能够填写您的约见日期和时间。

检查前请阅读“有用提示”。

### 约见信息

日期: \_\_\_\_\_

时间: \_\_\_\_\_

医务人员

姓名: \_\_\_\_\_

医务人员

编号: \_\_\_\_\_

医务人员

电子邮件: \_\_\_\_\_



## 检查准备

如果您对约见或检查有任何问题，请直接联系 Superior Mobile Insurance Solutions 或检查者。



### 企业办公室联系信息：

电话: 800-898.EXAM (3926)

传真: 888.548.3926

电子邮件: cs@smmininsurance.com

### 街道地址：

3838 Camino Del Rio N., Suite 250  
San Diego, CA 92108

### 邮寄地址：

P.O. Box 639014  
San Diego, CA 92163-9014

### 客户服务时间

周一至周五：上午6点至下午5点（太平洋时间）

800.898.EXAM (3926)

619.299.3926

传真: 888.548.3926

[www.smmininsurance.com](http://www.smmininsurance.com)

Superior Mobile Insurance Solutions  
能够在全国范围内提供各种辅助医疗服务。

## 辅助医疗检查

在向您签发保单之前，保险公司需要关于作为投保人的您的一些医疗信息。该信息将由一名经认证的医务人员通过辅助医疗检查收集。辅助检查包括询问您的病史、身高、体重、脉搏和血压。另外可能也需要采集尿样和血样。这套检查通常需要30到45分钟的时间。

辅助检查者将会与您联系，以便能够在您方便时尽早安排一次约见。这次约见可以是在您的住所、您的办公室或其他任何合适的场所进行。

### 病史信息

请您做好准备，回答一些有关您的家族病史的问题。医务人员将会询问您曾患的疾病，曾经接受的手术、检查和测试，以及其他任何治疗和服药史。您需要提供以下信息：

- 医师/医院的名称/地址
- 访问日期和目的
- 诊断结果
- 治疗
- 服药

您提供给医务人员的所有信息都将得到严格保密。此类信息将被转给保险公司的总部，且仅被用于承保目的。

### 一般问题

为什么是我？这是保险申请程序中的一个常规部分。

这要花多少钱？您无需为这项检查支付任何费用。保险公司将会支付所有费用。

## 血液检验

如果需要进行血液检验，则所使用的无菌材料都是在一次性血液工具盒中提供的，且只能使用一次。经认证的医务人员将在您在场的情况下打开密封的工具盒和无菌针。

血液检验会提供重要信息，供保险公司在承保程序中使用。一家实验室将进行各种各样的实验室检验，并将检验结果发给保险公司的总部。

根据保险公司的要求，您可能需要在抽血前禁食几小时。如果您以前在抽血时发生过晕厥、恶心或瘀斑，或您正在服用血液稀释剂或增大剂量的阿司匹林，则请告知您的检查者。请在检查前饮用一大杯的水。我们将会要求您签署允许我们获取血样和尿样的授权书。

## 其他要求

除辅助检查外，保险公司可能会有其他要求。如有此类要求，检查者或 Superior Mobile Insurance Solutions 将会通知您。这些要求可能包括由执业医师进行的检查、**静息心电图 (EKG)、跑步机 (应力试验)、定时肺活量 (TVC) 或者胸透。**

## 检查准备

为了在检查期间获得尽可能好的结果，避免人为升高的血压/脉搏读数，下面是一些有用的建议：

- 遵循禁食指示 - 大多数保险公司要求禁食6到8小时。
- 检查前1小时饮用一大杯的水，因为这将有助于获取尿样。
- 尽量将约见安排在一天中对您来说最不紧张的时间。
- 服用医生开处的常规药物。
- 列出您目前的所有服药情况，并将列表带到检查现场。请确保包括剂量、频率和处方医师姓名以节省检查的时间。
- 带上有照片的身证明（最好是驾驶证）。
- 穿着宽松的衣服、短袖衬衫或能够轻松卷起的长袖衫。
- 检查前至少8小时内，避免摄入酒精类物质。
- 检查前至少1小时内避免吸食任何形式的烟草或饮用咖啡因饮料。
- 检查前12小时避免进行任何重体力活动。
- 检查前24小时内避免摄入含盐量过高的食物。